

Zuweisung zur Knochendichtemessung an rheumatologie.luzern@luks.ch

Patientenangaben	Vorname/Name
	Strasse/Nr.
	PLZ/Ort
	Geburtsdatum

- DXA 1** Rasch möglicher Termin, standardisierte Therapieempfehlungen für Sie. (Keine Befundung durch uns!)
- DXA 2** Befundung durch uns auf Basis Ihrer mitgelieferten Angaben betreffend Vortherapie und Risikofaktoren
- DXA 3** Befundung durch uns auf Basis Ihrer mitgelieferten Angaben betreffend Vortherapie und Risikofaktoren. Mit gleichzeitiger osteoporosebezogener Konsultation auf der Endokrinologie Rheumatologie
- DXA Messung** Neu Verlauf / Vormessung am:

Eminent entscheidungsrelevante Angaben:

Bereits erlittene Frakturen nach Sturz aus Stehhöhe oder spontan nach dem 40. Lebensjahr ?

WICHTIG Welcher Knochen:

Wann:

Bisherige Osteoporose-Medikation

Bisphosphonat/welches	von	bis
Prolia	von	bis
Forsteo (Teriparatide) oder Evenity (Romoszumab)	von	bis
Evista (Raloxifen)	von	bis

Risiko Medikamente

Cortisol-Präparat Dosis:	von	bis
Aromatasehemmer	von	bis

Indikation mit Kassenpflicht (Details s.KLV, Anhang 1)

- Fraktur ohne adäquates Trauma
- Verlaufskontrolle bei behandelter OP alle 2 Jahre
- Primärer Hyperparathyreoidismus (ohne klare OP-Indikation)
- Hypogonadismus oder hormonablativ Therapie bei ♀ und ♂
- Langzeit-Glucocorticoidbehandlung
- Osteogenesis imperfecta
- Malabsorption (z.B. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Zöliakie)
- HIV
- Antikonvulsiva
- Andere Indikation

Hier bitte die Patienten/Innen unbedingt über die fehlende Kassenpflicht informieren, danke.

Praxisstempel